

## XXV

---

Diagnose d'un nouveau genre de Diptères

---

---

(Voir Bulletin des Séances du 9 Mars 1881, no 5, page 47.)

---

Genre **Atopognathus** (*G. nov.*, mihi) ( $\alpha\tau\omega\piος$ ,  $\gamma\gamma\acute{\alpha}\thetaος$ ).

Generis *Urophoræ* proximum, secundum ordinamenta Rondanii et Schineris :

*Haustello crasso*, labris maxime dilatatis; *palpis latis*, *depressis*, *lamellatis*, *rotundatis*; *vertice macrochetis sex longis*, *erectis*, *in serie duplii dispositis*; *fronte latâ*, *breviter villosâ*; *genis ♂*, *ante*, *suboculis*, *utrinque uniappendiculatis*, *appendiculis compressis*, *modice erectis*, *obovatis*; *alarum venâ secundâ totâ spinosulâ*; *femoribus incrassatis*, *anterioribus subtus spinosulis*, *tibiis*, *apice*, *spinis longis armatis*.

♀. *Genis nullo modo appendiculatis*; *terebrâ longiusculâ*, *apice acuminatâ*, *intus se retrahente*.

A. **PLATYPALPUS** (*sp. nov.*, mihi).—Long. 5 1/2 mill.—*Haustello fusco*; *palpis albis*, *vittâ frontali latâ*, *fuscâ*, *utrinque albo lineatâ*; *orbitis albido circum marginatis*; *antennis albidis*, *segmentis duobus basalibus fuscis*, *tertio supernè fusco lineato*, *cheto albido*, *apice fuscano*, *genarum appendiculis fuscis*; *thorace scutelloque æneis*; *abdomine pedibusque nigris*, *nitidis*, *tarsis albis*, *summo apice nigris*; *halteribus niveis*; *alis albidis*, *vittâ latâ*, *transversali*, *obliquâ*, *fuscâ*, *furcatâ*, *ad marginem externam et usque ad venam quintam externe continuatâ*, *versus apicem bis albido notatâ*, *margine posticâ vittâ abbreviatâ notatâ*, *basi alarum latè fuscâ*, *maculis quinque*, *vel sex?* *plus minusve albidis*, *plus minusve latis*, *irregulariter variegatâ*.

♀. *Colore simillima*.

Ternate. Masculum 1, feminæ 5, ex Museo nostro.

